
四川省疾病预防控制中心
关于印发《四川省家庭“新型冠状病毒
感染的肺炎”预防指南》等 5 个预防指南的通知



四川省家庭“新型冠状病毒感染的肺炎”预防指南

四川省公共场所室内环境“新型冠状病毒感染的肺炎”预防指南

四川省公共交通工具“新型冠状病毒 感染的肺炎”预防指南

四川省学校及托幼机构
“新型冠状病毒感染的肺炎” 预防指南

四川省农贸市场“新型冠状病毒感染的肺炎” 预防指南

一、保持工作场所清洁卫生及空气流通，每日进行清洁、消毒，尤其是活禽畜类相关场所，垃圾、粪便集中进行无害化处理。消毒时，对于人体接触较多的物体表面，可用 500mg/L 的含氯消毒剂进行喷洒或擦拭消毒，作用 30 分钟后再用清水洗净。对不耐腐蚀的物品，可以用 75%酒精或者 0.1%苯扎溴铵（新洁尔灭）擦拭消毒，使用时应注意安全。大面积的地面和墙面，可用有效氯为 500-1000mg/L 的含氯消毒剂溶液进行喷洒，喷洒量以表面湿润且无滴流现象为准，作用时间应不少于 30 分钟。

二、佩戴口罩，尽量佩戴医用口罩或者医用外科口罩。佩戴时，避免手接触到口罩内侧面，每隔 4 小时或者发现潮湿时更换；保持手卫生，咳嗽或打喷嚏后、饭前便后、接触或处理动物排泄物后、手脏时，应使用肥皂和流水洗手；，咳嗽、打喷嚏时，应当尽量避开人群，用手肘内侧或纸巾将口鼻完全遮住。用过的纸巾立即丢弃到垃圾桶内，并及时洗手；不随地吐痰。痰液应当用纸巾包裹，随后将纸巾丢弃至垃圾桶内，并及时洗手；保持安全距离。在市场中，与他人交流时保持 1 米以上的安全距离；远离野生动物。不接触、购买和食用野生动物，尽量避免前往售卖活

禽、野生动物等的摊位。

三、不乱扔口罩。一次性口罩用完即抛弃（最好剪坏），不能反复使用，不能两面轮流戴。用过的口罩单独装在塑料袋等密封袋中扔进垃圾桶里。摘除口罩后及时洗手。

四、加强病媒生物防制。落实“三防”设施的使用，发现有明显鼠迹应开展灭鼠工作。

五、出现病死禽畜时，要及时向畜牧兽医部门报告，并按照规定妥善处理病死禽畜。如果发现禽畜类大量生病或死亡等异常情况，立即关闭工作场所，并及时向当地畜牧兽医部门报告。